

Nieuwe verkorte indicatieteksten add-on geneesmiddelen vanaf 1 jan 2019

Inleiding

Voor de registratie van de indicatie van add-on geneesmiddelen, zijn verkorte indicatieteksten opgesteld. De huidige verkorte indicatieteksten voor de add-on geneesmiddelen, die sinds 1 januari 2017 in de G-standaard beschikbaar zijn, zijn gerangschikt op alfabetische volgorde per geneesmiddel. De teksten zijn een samenvatting van de volledige SMPC tekst (officiële registratietekst) bij geregistreerde indicaties of een samenvatting van de aangeleverde off-label tekst door de wetenschappelijke vereniging. De volgorde van de verkorte tekst wordt bepaald door de volgorde van de volledige tekst.

De volgende onderwerpen worden in volgorde van belangrijkheid in de verkorte tekst verwerkt:

1. Ziektekenmerken en leeftijd
2. Lijn van behandeling
3. Combinatietherapie (benoemen wanneer specifiek) of monotherapie

De maximale lengte van een verkorte tekst mag 120 tekens bevatten.

Nieuwe opzet verkorten indicatieteksten

Naar aanleiding van feedback uit het veld is door VWS besloten om de wijze van verkorten van de indicatieteksten, aan te scherpen. Hiermee moet het volgende bereikt worden:

- Alle teksten behorende bij dezelfde diagnose staan onder elkaar wanneer een keuze gemaakt moet worden tijdens het voorschrijven; de verkorte tekst begint altijd met het indicatiegebied
- Geen zinnen maar begrippen die gescheiden worden met een komma en bij elkaar de indicatietekst weergeven
- Werken met afkortingen die zijn afgestemd met de WV

Met deze opzet kan sneller worden gezocht bij het voorschrijven in de indicatieteksten van een add-on geneesmiddel.

NVMO-indicaties

De nieuwe teksten zijn opgesteld door het CIBG in afstemming met de NVMO (nieuwe commissie off-label indicatiestelling oncologische middelen o.l.v. Metin Tascilar, procesondersteuning door Annette Lamboo). De nieuwe teksten zullen vanaf de G-standaard van januari 2019 actief zijn. Deze teksten staan dan in de elektronische voorschrijfsystemen. Indicatie nummers blijven gelijk, alleen de tekst verandert. **Om de inhoud van de nieuwe tekst juist te interpreteren is het van groot belang de gebruikte afkortingen te kennen.** Zie hiervoor het Excel bestand tabblad 2. Voor de G-standaard van feb 2019 zal nog een wijziging worden doorgevoerd: C wordt overal CA.

Voorbeelden nieuwe verkorte indicatieteksten

Naam werkzame stof	Indicatie SmPC of off-label	TXKORT (Verkorte indicatietekst)	Nieuwe verkorte indicatie
Abirateron	Met prednison of prednisolon voor de behandeling van gemetastaseerde castratiereistente prostaatkanker bij volwassen mannen die asymptomatisch of licht symptomatisch zijn na falen van androgeendeprivatietherapie en voor wie behandeling met chemotherapie nog niet klinisch geïndiceerd is.	Gemetastaseerde castratiereistente prostaatkanker bij volwassen mannen, voor chemotherapie	CRPC, m, voor chemo, combi met prednison of prednisolon (Volw. man)
Abirateron	Met prednison of prednisolon voor de behandeling van gemetastaseerde castratiereistente prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen bij wie de ziekte progressief was tijdens of na een chemotherapieschema op basis van docetaxel.	mCRPC bij volwassen mannen na chemotherapie, combinatie met prednison of prednisolon	CRPC, m, na chemo, combi met prednison of prednisolon (Volw. man)
Aflibercept	In combinatie met irinotecan/5-fluorouracil/folinezuur (FOLFIRI) chemotherapie voor gebruik bij volwassenen met gemetastaseerde colorectale kanker (mCRC) die resistent is tegen of progressie vertoont na een oxaliplatine-bevattend behandelingschema.	>= 2e lijnsbehandeling van mCRC bij volwassenen, in combinatie met FOLFIRI	CRC, m, >=2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.)
Axitinib	De behandeling van volwassen patiënten met gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) na falen van een eerdere behandeling met sunitinib of een cytokine.	>= 2e lijnsbehandeling van gevorderd/gemetastaseerd RCC bij volwassenen	RCC, adv of m, >=2de lijn (Volw.)
Bevacizumab	In combinatie met interferon alfa-2a voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker.	1e lijnsbehandeling van gevorderde en/of gemetastaseerde RCC bij volwassenen, combinatie met interferon alfa 2-a	RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a (Volw.)

Oproep

Indien jullie onjuistheden of onvolledigheden in een afkorting tegenkomen heel graag melden bij:

Annette Lamboo

Mail: annette@care-together.nl

Tel: 06-53762981